

ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

32^e Mémoire (¹)

LI

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES DE LA FAMILLE DES SALTICIDAE

(Suite)

Par EUGÈNE SIMON.

Sandalodes calvus, sp. nov. — ♂ long. 8-10 mill. — Cephalothorax altus, utrinque ample rotundus, antice attenuatus, obscure fusco-castaneus, fulvo-rufulo-pubescent, parte cephalica macula frontali, thoracica vitta media sat angusta et abbreviata, vittaque marginali latiore albido-pilosis decoratus. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus in medio setis albis paucis munitus. Abdomen oblongum, supra fuscum, fulvo-rufulo-pubescent, vitta media sat lata integra dilutiore, albido-pilosa sed postice leviter luteo-tincta ornatum, subtus atrum albo-testaceo-marginatum. Chelae validae, longae et parallelae, fusco-castaneae, nitidae, parce et subtiliter striatae, intus parce albido-setosae, marginibus sulci longis, dentibus parvis remotis. Partes oris fusco-castaneae, laminae sat longae, extus angulosae. Sternum nigrum, albo-pilosum. Pedes longi, valde et longe albo nigroque hirsuti, quatuor antici obscure fusi, femoribus nigris, tarsis ad basin fulvis, quatuor postici paulo dilutiores, femoribus subtus infuscatis. Pedes maxillares graciles et longi, femore patellaque supra albido-crinitis; femore leviter curvato; tibia patella breviore, subtus praesertim intus, convexa, extus apophysi tenui, antice, secundum tarsum directa, armata: tarso angusto et longo; bulbo ad basin transversim凸, extus obtusissime turbinato, ad apicem depresso et longe fiso, ramulo exteriore obtuso, interiore acuminato et stylo recto munito.

♀ long. 10 mill. Cephalothorax niger, rubro-pubescent, vitta media latiore, marginem frontalem attingente, vittaque marginali albo-pilosis ornatus. Pili oculorum et clypei longi et densi albi, supra oculos medios rufuli. Abdomen majus, nigrum, obscure rubro-pubescent, vitta media albida antice acuminata, postice utrinque profunde tridentata supra ornatum. Pedes, praesertim antici, breviores.

Queensland : Cooktown.

(1) Voir pour les Mémoires 1 à 31, I à L. *Annales de 1873 à 1901.*

Gangus (¹) **longulus**, sp. nov. — ♂ long. 3,5 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, parte cephalica nigra, thoracica prope marginem infuscata, supra crebre et longe albido-pilosus, utrinque prope oculos atque in medio pilis fulvis paucis munitus, parte thoracica in declivitate fere glabra sed linea marginali albo-pilosa cincta. Pili oculorum aurantiae, supra oculos medios albi. Clypeus angustus parce albo-pilosus. Oculi antice maximi, inter se contigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus sat longus, parallelus, oculi parvi ser. 2^a longe ante medium siti. Abdomen angustum et longum, supra luteo-testaceum, vittis binis fuscis marginatum, albido-pilosum et hirsutum, subtus olivaceo-nitidum, glabrum. Chelae nigro-nitidae, coiraceea. Sternum fuscum, in medio dilutius. Pedes antice robusti, femoribus clavatis, fusco-castanei, coxis-femoribus, tibiis utrinque nigricantibus, metatarsis ad basin tarsisque luteis. Reliqui pedes obscure fulvi, coxis nigricanti vittatis, femoribus tibisque utrinque ad apicem nigricantinotatis, cuncti valde albo-pilosoi et hirsuti. Pedes-maxillares sat gracieles, fusi, albo-hirsuti; tibia extus ad apicem apophysa nigra valida et acuta, antice directa, armata; tarse ovato; bulbo magno, baud longiore quam latiore, ad basin breviter attenuato et producto, ad apicem oblique secto et stylo brevi munito.

♀ Long. 6-7 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica leviter olivaceo-tincta, utrinque prope oculos nigra et maetus binis fuscis confusis notata, sed crebre albo-pilosa, utrinque sub oculis pilis fulvis munita et fasciculo longo ornata, parte thoracica antice, pone oculos, lineola transversa recurva et sinuosa, praeterea lineolis tenuibus radiantibus, saepe vix expressis, fuscis, notata. Pili oculorum et clypei albi, densi et longi. Area oculorum dorsalium vix latior postice quam antice. Abdomen longum et angustum, albido-testaceum, supra, utrinque crebre nigro-striolatum et clathratum, vitta media lata, antice linea nigra exillima secta, notatum, subtus linea media nigra, saepe antice evanescente, notatum. Chelae, partes oris, sternum pedesque omnino flavidoo-testacea.

Queensland : Cooktown.

G. decorus, sp. nov. — ♀ long. 8,5 mill. Cephalothorax niger, parte cephalica in medio dilutiore et rufescenti-tincta, parte thoracica vitta

(¹) **Gangus**, nov. gen. A *Sandatodi* differt sterno antice acuminato et coxis 1^o paris a sese parum distantibus (fere *Marpissae*), quadrangulo oculorum longiore, 1,5 tantum latiore quam longiore. — Typus: *G. (Acomps) concinnus* Keyserling.

marginali lata vittaque media crebre albo-pilosus ornata. Pili oculorum pauci cinerei. Clypeus pilis albis densis et longissimis hirsutus. Abdomen longe oblongum, supra nigrum, antice arcu transverso, dein vitta longitudinali leviter sinuoso-angulosa et postice segmentata, utrinque maculis trinis obliquis niveo-pilosus ornatum, subtus atrum, vitta media postice attenuata, dilutiore et albo-pilosa et postice, prope mamillas, utrinque macula parva alba ornatum. Chelae robustae et convexae, nigro-aeneae, nitidae. Partes oris, sternum pedesque nigricantia, tarsis cunctis ad basin luteo-annulatis. Plaga genitalis subrotunda, nigra, leviter depressa et coriacea.

Queensland : Cooktown.

Hyllus argyrotoxus, sp. nov. — ♂ Long. 8-9 mill. — Cephalothorax nigerrimus, parte cephalica, paulo ante oculos posticos, linea transversa sat angusta leviter flexuosa et saepe tripartita, parte thoracica, prope medium, utrinque vitta arcuata atque ad marginem linea sat angusta niveo-pilosus, structe decoratus. Pili oculorum et clypei breves, cinereo-albidi. Abdomen sat angustum, nigrum, supra intense nigro-velutinum et linea media, apicem hand attingente et interrupta, niveo-pilosa ornatum, subtus utrinque albo-marginatum. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelae longae, parallelae, antice deplanatae, nigro-opaceae et valde coriaceae, ad basin setis validis erectis et inordinatis sordide albidis munitae, praeterea minutissime et parce albo-pilosae. Pedes longi, nigri, tarsis posticis fulvis, femoribus posticis annulo medio albo-piloso ornatis, patellis tibiisque cunctis superne albo-lineatis. Pedes maxillares sat graciles, nigri, femore patellaque supra crebre niveo-squamulatis; tibia patella paulo breviore et paulo latiore, utrinque longe crinita, extus apophysi conica subacuta, recte divaricata, armata; tarso breviter ovato; bulbo ovato, in conum submembranaceum et obtusissimum elevato, intus stylo libero marginato.

Africa austro-orient. : Zululand (Dr Ch. Martin).

H. brevitarsis, sp. nov. — ♂ long. 12-14 mill. — Cephalothorax altus, utrinque ample rotundus, antice valde attenuatus, niger, in declivitate leviter rufescenti-tinctus, pilis brevibus pronis cinereo-sericeis crebre vestitus et setis longissimis erectis albis conspersus. parte thoracica linea media lineaque marginali confusa albidioribus notata. Pili oculorum et clypei crassi et densi, albido-lutei, inter oculos medios fulvi. Abdomen longe oblongum, nigrum, supra pilis brevibus cinereo-sericeis crebre vestitum, subtus vitta media nigra notatum. Chelae verticales et parallelae, antice convexae et valde rugatae, setis

albidis crassis, ad basin longis, apicem versus sensim minoribus, crebre vestitae, marginibus sulci brevibus, dentibus parvis, ad radicem unguis parum distantibus munitis. Partes oris sternumque nigra, laminae extus dilatato-angulosae. Pedes, praesertim antici, longi, nigricantes, (praesertim subtus in patellis tibiisque anticus) valde et longe albo-nigroque hirsuti, antici, saltem in femoribus utrinque, breviter rubro-pubescentes, postici parcius rubro-pilos, minute et parce albo-squamulati, metatarsis anticus insigniter brevibus. Pedes-maxillares mediocres, nigri; hirsuti femore curvato; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi depressa antice oblique directa, haud attenuata, apice obtuse truncata et minute serrulata, armata; tarse sat anguste ovato; bulbo ovato, elevato et turbinato, stylo libero omnino circumdato.

♀ Long. 45 mill. — Cephalothorax niger, pilis albis fulvisque mixtis crebre vestitus, vitta media latissima et confusa albidiore notatus, setis albis longissimis et erectis conspersus, utrinque, sub oculis ser. 2^{ac}, fasciculo setarum nigrarum ornatus. Pili oculorum, clypei et chelarum densi et longi, albidi. Abdomen crasse ovatum, supra fuscum, vitta media lata abido fulvoque pilosa, utrinque dentata et ramulos emittente, notatum, utrinque fuscum et maculis niveis trimis, anticus binis angustis altera ovata, ornatum, subtus vitta lata nigra, postice, prope mamillas, lineolis parvis fulvis binis segmentata, notatum. Pedes breviores, fusi, valde albo-hirsuti.

Africa austr. : Prom. Bonae Spei, Pt-Elizabeth, Transvaal!

H. aurantiacus, sp. nov. — ♂ long. 8-9 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, utrinque late nigro-marginatus, aurantiaco-pubescentes. Pili oculorum breves, supra aurantiaci, inter oculos et subtus albi. Clypeus fere glaber, ad marginem pilis albis uniseriatis munitus. Oculi postici magni. Abdomen breviter ovatum, supra rubrum, laete aurantiaco-nitido-pubescentes et vittis nigricantibus binis dentatis, saepe confusis et extremitates haud attingentibus, notatum, subtus luteo-testaceum parce aurantiaco-pilosum. Chelae robustissimae, divaricatae, intus deplanatae et prope basin carinulatae, extus valde convexae, aeneo-nitidae, intus et subtus rufulae, marginibus sulci longis et depressis, dentibus remotis, superiore, angulari, longo et obtuso, inferiore minore oblique truncato, armatis. Partes oris castaneae, laminae apice dilutiores. Sternum coxaeque lutea. Pedes 1^o paris fusco-castanei, reliqui fulvo-rufuli, femoribus ad basin, metatarsis tarsisque luteis, metatarso 2^o paris aculeis lateralibus binis intus armato, metatarso 4^o paris aculeis apicalibus verticillatis, aculeis subbasilaribus binis,

submediis binis instructo sed aculeis inferioribus carente. Pedes-maxillares graciles et longi, rubro-castanei; tibia patella paulo breviore, angustiore, apophysi apicali longa, gracili, antice directa et leviter flexuosa armata; tarso anguste ovato, sed tibia multo longiore; bulbo ovato, ad basin vix producto, apice truncato et stylo longo, circulum magnum formante, munito.

Africa austro-or. : Natal, Zululand (*D^r Ch. Martin*).

H. flavescentia, sp. nov. — Long. 6-7 mill. — Cephalothorax laevis et fere glaber, fulvo-testaceus, parte cephalica rubro-lineta et maculis ocularibus nigris notata, antice rubro utrinque albo-pilosa. Pili oculorum supra oculos aurantiaci, inter oculos et subtus albi. Clypeus fere glaber, parcissime albo-pilosus. Abdomen albido-testaceum subglabrum. Chelae fusco-rufulæ, glabrae, leviter coriaceæ, validæ, convexæ et leviter divaricatae, marginibus sulci sat longis ut in praecedenti armatis. Partes oris, sternum pedesque luteo-testacea, pedes 4ⁱ paris (coxis femoribusque exceptis) paulo obscuriores et rufescen-tinæ, aculeis ut in praecedenti ordinatis, sed metatarso 4ⁱ paris aculeo-inferiore submedio munito. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, graciles et longi, supra parce albo-squamulati; tibia patella fere aequilonga, tereti, apophysi apicali longa gracili, intus (in parte apicali) minute granulosa, extus armata; tarso angusto; bulbo longe ovato, ad basin attenuato et breviter producto, ad apicem stylo libero, circulum formante, munito.

Natal (*D^r Ch. Martin*).

Corrhatus scriptus, sp. nov. — ♂ long. 7-8 mill. — Cephalothorax niger, obscure fulvo-olivaceo-pubescentia, parte thoracica linea media abbreviata vittaque marginali lata albo-pilosus ornata. Pili oculorum rubri. Clypeus utrinque rubro-pilosus, in medio fere glaber, setis longis conspersus. Abdomen supra nigrum, obscure olivaceo-pubescentia, vitta media leviter lanceolata, apicem haud attingente, postice utrinque macula longa, punctoque apicali albo-pilosus decoratum, subtus albo-pilosum, regione epigasteris coriacea rugoso-striata. Chelae sat debiles, parallelæ, fusco-rufulæ, laeves et subglabrae, marginibus sulci brevibus, declivibus, haud prominulis. Partes oris, sternum (postice paulo dilutius) pedesque nigra, metatarsis ad basin tarsisque cunctis fulvo-rufulis et tibiis 4ⁱ paris annulo medio rufulo notatis, nigro-hirsuti, femoribus 4ⁱ paris intus rubro-pilosus, reliquis femoribus supra macula magna niveo-pilosa ornatis, metatarsis anticis tibiis multo brevioribus, tarsis haud longioribus, posticis tibiis saltem aequilongis, aculeis validis et longis ordinariis armati. Pedes-maxillares sat breves,

fulvo-rufuli, longe albo-hirsuti; tibia patella breviore, apophysi exteriore divaricata, gracili, apice minute curvata, armata; tarso ovato; bulbo ovato, ad basin sat longe et oblique retro-producto, intus stylo libero curvato munito. — Oculi antici apicibus in lineam rectam. Quadrangulus oculorum, superne visus, parallelus vel fere parallelus.

Africa occid. : Gabon.

C. taprobanicus, sp. nov. — ♂ long. 6,5 mill. — Cephalothorax niger, supra obscure aeneo-squamulatus, in declivitate fere glaber, sed vitta marginali latissima albo-pilosa cinctus. Pili oculorum et clypei breves, fulvo-rufuli nitidi. Abdomen breviter ovatum, postice acuminatum, supra atrum, in parte basali omnino aeneo-nitido-squamulatum et linea marginali angusta alba cinctum, in parte altera vitta media lata aeneo-squamulata, utrinque macula obliqua punctoque, atque ad apicem, supra mamillas, puncto parve albo-pilosus decoratum, subtus fusco-testaceum, nigro-punctatum et utrinque late albo-marginatum. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelae sat longae, antice planae, glabrae, aeneae, valde coriaceae et transversim rugatae, extus dilatatae, intus emarginatae, utrinque carinulatae, intus ad apicem dilatato-angulosae, margine sulci superiore dentibus parvis binis, inferiore dente majore armatis. Pedes antici nigricantes, metatarsis, apice excepto, tarsisque dilutioribus, tibiis metatarsisque subtus sat crebre nigrociliatis, patellis intus albo-pilosus. Pedes posticii fusi, coxis trochanteribus metatarsis tarsisque luteis sed metatarsis apice fusco-annulatis, aculeis numerosis ut in *C. viduo* C. Koch ordinatis. Pedes-maxillares graciles et longi, fusi, nigro-setosi: tibia patella paulo longiore et graciliore, tereti, intus longissime crinita, extus apophysi apicali brevi, conica sed apice minute uncata armata; tarso tibia vix longiore, haud angustiore; bulbo parvo et longo ad basin vix producto, ad apicem longe et sensim acuminato.

♀ Long. 7-8 mill. — Cephalothorax niger, supra aeneo-subaureo squamulatus, utrinque, sub oculis, fulvo-rufulo-pilosus, dein in declivitate subglaber sed vitta marginali alba cinctus. Abdomen latius, in parte basali aeneo-micanti-squamulatum et linea alba anguste cinctum, in parte altera nigrum, vitta media micanti-squamulata, prope medium punctis binis longis, dein linea transversa procurva et leviter sinuosa, punctis binis obliquis, postice punetis similibus obliquis et supra mamillas puncto parvo albo, laete decoratum.

Ins. Taprobane : Colombo! Kandy!

A *C. viduo* C. Koch, cui affinis est, differt ab domine haud vittato

chelis antice valde rugatis, pedum-maxillarium bulbo minore postice vix producto etc.

C. singularis, sp. nov. — ♀ long. 4 mill. — Cephalothorax sat longus, modice altus, niger, pilis obscure rubris vestitus, vitta media pallide luteo-pilosa, antice marginem frontalem haud attingente, postice sensim attenuata, vittaque marginali lata niveo-pilosa ornatus. Pili oculorum crassi, inter oculos albi, supra rufuli, genis lineis albis obliquis sectis. Clypeus pilis albis crassis et obtusis fere bacilliformibus et inordinatis conspersus. Area oculorum vix latior postice quam antice, oculi parvi ser. 2^{ae} vix ante medium siti. Oculi antici inter se sub-contigui, in lineam subrectam. Abdomen oblongum, atrum, supra obscure rubro-pubescentia, vitta media lata parallela et integra albo-luteo pubescenti, ornatum, subtus albo-pubescentia. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelae longae, verticales, angustae et leviter incurvæ, intus carinulatae, usque ad angulum convexæ et obtusæ, antice deplanatae, fusco-rufulæ, coriaceæ et pilis albis crassis et obtusis conspersæ. Pedes nigricantes, valde nigro alboque hirsuti et parce rufo-pilosæ, metatarsis tarsisque, praesertim posticis, dilutioribus et rufescensibus. Pedes-maxillares sat graciles, fulvo-rufescentes, valde albo-hirsuti; tibia patella circiter aequilonga, extus apophysi apicali gracili et acuta, oblique divaricata, armata; tarsø sat anguste ovato; bulbo ovali, postice sub tibia obtuse producto, ad apicem stylo munito.

Africa austr. : Bloemfontein!

EUGASMIA⁽¹⁾ BARBATA Karsch (*Eris*) *Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.*, LIII, 1880, p. 397. — ♂ long. 7-8 mill. — Cephalothorax niger, antice et in medio viridi-aureo-pubescentia, vittis dorsalibus binis latissimis, postice convergentibus et coronam ovatam designantibus vittaque marginali paulo angustiore, niveo-pilosis decoratus. Pili faciei et oculorum breves, obscure fulvo-aenei, pili clypei densissimi nivei. Abdomen ovatum, atrum supra viridi-aureo-pubescentia, antice linea marginali arcuata, propre medium punctis binis vel quatuor, dein linea transversa recurva, in medio interrupta, postice, prope mamillas, lineolis parvis binis niveo-pilosis, decoratum, subtus atro-testaceum. Sternum nigrum albo-pilosum. Chelae longae, fere parallelæ, antice nigrae et valde coriaceæ, in parte basali creberrime, inordinate et longissime albo-hir-

(1) **Eugasmia**, nov. gen. — A *Corrhozo* differt oculis antieis majoribus a sese subcontiguis, apicibus in lineam subrectam, clypeo chelisque antice creberrime albo-hirsutis. — Typus : *E. (Plexippus) saunio* Thorell.

sutae, apice haud productae, marginibus sulci brevibus, haud prominentibus, inferiore dente valido armato, ungue ad basin crasso, nigro et supra convexo, apice rufulo et arcuato. Pedes parce aeneo-pilosii et longissime albo-hirsuti, nigricantes, metatarsis, apice excepto, tarsisque fulvo-rufulis, metatarsis anticis tibiis vix brevioribus, aculeis numerosis ut in *E. sannioni* Th. ordinatis. Pedes-maxillares longi, nigri, nigro-hirsuti: femore sat robusto, curvato; patella robusta, saltem duplo longiore quam latiore; tibia patella saltem aequilonga, multo graciliore, tereti, leviter curvata, intus longissime crinita, extus ad apicem apophysi parva et acuta, antice directa, armata; tarso minutissimo, tibia saltem 4/3 breviore et haud latiore, apice obtuso et leviter inflexo; bulbo parvo simplici.

Ins. Luzonia!

Diagondas (¹) **viridiaureus**, sp. nov. — ♂ long. 6-6,5 mill. — Cephalothorax niger, laevis, pilis prouis rufulo-aureis nitidis crebre vestitus et vitta marginali latissima albo-pilosa cinctus. Pili oculorum supra rufuli subtus et inter oculos albi. Clypeus pilis albis longis uni-seriatim munitus. Abdomen oblongum, atrum, splendide viridi-micanti-squamulatum, in parte secunda utrinque puncto niveo puncto que apicali simili ornatum, subtus atrum cinereo-pubescent et antice utrinque albo-marginatum. Chelae longissimae, porrectae, attenuatae, nigrae, ad basin et extus laeves et parce erinitae, subspinulosae sed in parte apicali deplanatae, coriaceae et utrinque carinulatae. Sternum nigrum, parce albo-pilosum. Pedes nigri, tarsis anticis metatarsisque posticis ad basin tarsisque posticis totis dilutioribus et fulvis. Pedes-maxillares graciles et longi nigri; tibia patella longiore, tereti, apophysi apicali brevi sed valida et compressa armata; tarso tibia vix latiore haud longiore; bulbo parvo simplici.

♀ long. 6 mill. — Cephalothorax fere maris sed paulo angustior. Pili oculorum rufuli, clypei longi albi. Chelae robustae sed breves et verticiales, fusco-rufulæ, antice, praesertim intus, crebre et longe albido-erinitæ. Abdomen majus, nitido viridi-squamulatum, antice linea marginali arcuata, in medio punctis parvis quatnior, in parte secunda utrinque vitta obliqua abbreviata puncto que apicali albido-luteo-pilosis ornatum. Pedes breviores, nigricantes, annulis albo-pilosis ornati, me-

(1) **Diagondas**, nov. gen. — A *Philaco* differt oculis anticis a se sub-contiguis, in lineam subrectam, tegumentis micanti-squamulatis, chelis maris longis, attenuatis et proclivibus, bulbo maris *Eugasmiae*. — Typus: *P. viridiaureus* E. Sim.

tatarsis tarsisque cunctis, tibiisque posticis ad basin dilutioribus et rufescens.

Brasilia : Le Para (*de Mathan*).

D. micans, sp. nov. — ♀ long. 3,5 mill. — Cephalothorax niger, in medio dilutior et rufescens, squamulis aeneo-viridi roseo-que-micantis-ibus obtectus, vitta marginali albo-squamulata latissima cinctus, supra macula frontali parva, vitta lanceolata et utrinque, prope oculum posticum, puncto, albis decoratus. Pili oculorum rufo-coccinei. Pili clypei crassi nivei. Abdomen oblongum, aeneo-micanti-squamulatum, antice vitta transversa lata, dein vittis transversis angustioribus, in medio interruptis, albo-squamulatis et nigro-marginatis, et prope apicem maculis longitudinalibus nigris, albo-unipunetatis, laete decoratum, subtus in medio obscurius et parce micanti-squamulatum sed utrinque crebrius sordide albido-squamulatum. Sternum fuscum, albido-squamulatum. Chelae breves, fusco-rufulae, subtiliter et remote rugatae atque ad basin squamulis albis paucis munitae. Pedes fulvi, albido-aeneo que pubescentes, leviter fusco-variati et subannulati. Plaga genitalis laevis, fusca, subcordiformis, postice fovea parva subquadrata impressa.

Paraguay (*Germain*).

Evarcha (¹) **Kochi**, sp. nov. ♂. — Long. 6 mill. — Cephalothorax laevis, fulvo-rufescens, parte cephalica nigro-aenea, vitta lata transversa niveo-pilosa antice marginata, parte thoracica versus marginem sensim infuscata, vitta lata arcuata semicirculari vittaque marginali albo-pilosis decorata. Pili oculorum supra albidi, subtus fulvi. Clypeus nudus. Abdomen atrum, supra vitta media lata integra et utrinque vitta marginali testaceis et albo-pilosis ornatum, subtus atrum, testaceo-marginatum. Chelae longae, sat angustae, glabrae, nigro-nitidae, apice leviter rufescentes, transversim valde striatae. Sternum et partes oris nigra. Pedes 1^o paris reliquis robustiores, nigricantes, crebre et longe nigro-hirsuti, tarsio luteo. Pedes 3^o paris femore nigro, patella tibia metatarsoque ad basin late dilutioribus et olivaceis. Pedes 4^o paris fulvi, femore, tibia metatarsoque apice infuscatis. Pedes-

(1) **Evareha**, nov. gen. — Ab *Eugasmia* differt oculis parvis ser. 2^æ vix ante medium sitis, metatarsis anticis, tarsis haud vel vix longioribus, aculeis inferioribus munitis sed aculeis lateralibus carentibus. pedibus 3^o paris pedibus 4^o paris evidenter longioribus. — Typus : *Araneus flammatius (falcatus)* Clerck.

maxillares nigri, nigro-hirsuti, tarso apice dilutiore et albo-pilosos; tibia patella breviore, latiore quam longiore, extus apophysi minutissima, apice truncata, armata; tarso late ovato, sed apice sat longe attenuato; bulbo disciformi, simplici, stylo omnino circumdato.

Java : Palabuan, Teugger. — Lombok (*Fruhstorfer*).

E. natalica, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax nigro-castaneus, parte thoracica antice leviter dilutiore et rufescens-tincta, rubro-pilosus (fere omnino depilis). Pili oculorum supra oculos fulvi, subtus albidi. Clypeus parce et longe albo-pilosus. Abdomen breviter ovatum, atrum, vitta media dilutiore supra notatum, pilis simplicibus flavo-nitidis subaureis vestitum, subtus fere glabrum. Chelae robustae, ad basin convexae, leviter coriaceae et rugatae, nigrae, apicem versus leviter rufulo-tinctae. Pedes robusti, fusi vel nigricantes, coxis, praesertim posticis, dilutioribus, metatarsis sex posticis luteis, metatarsis anticis aculeis inferioribus longis 2-2 aculeisque interioribus binis minoribus munitis. Pedes-maxillares fusco-rufuli; tibia patella paulo breviore et paulo angustiore, apophysi apicali gracili et acuta, sat longa et antice oblique directa, extus armata; tarso sat longo; bulbo ovato, ad basin leviter attenuato sed obtuso, ad apicem stylo longo, circulum formante, munito.

Natal (*D^r Ch. Martin*).

Poessa ⁽¹⁾ **argenteo-frenata**, sp. nov. — ♂ long. 4.5 mill. — Cephalothorax laevis, parte cephalica nigro-nitida utrinque fulvo-rufulo-pilosa et inter oculos macula albo-pilosa ornata, thoracica castanea antice vitta lata semicirculari dilutiore lineaque marginali angustiore albo-pilosis notata. Pili oculorum laete rubri. Clypeus angustus, ad marginem vitta angusta crebre niveo-barbata marginatus. Abdomen nigrum, supra fulvo-olivaceo-pubescent et vittis binis integris et parallelis laete albo-argenteo-squamulatis, decoratum, subtus parce cinereo-pilosum. Chelae laeves, nitidae et glabrae, nigrae apice rufulae. Partes oris sternumque castanea, parce albo-pilosa, laminae extus minute dentatae. Pedes I paris nigro-castanei, femore patella tibiaque supra dilutioribus et subvittatis, metatarsis tarsisque luteis. Reliqui pedes lutei, coxis femoribusque obscurioribus, utrinque fere nigris. Pedes-maxillares fusi, albo-pilosi et hirsuti; tibia patella breviore,

(1) **Poessa**, nov. gen. — A *Viciria* praesertim differt pedibus quatuor posticis inter se subæqualibus, tibia 3^o paris teretriuscula. — Typus : *P. argenteo-frenata* E. Simon.

extus ad apicem apophysa acuta obtuse divaricata armata; tarso ovato, apice longe attenuato; bulbo ad basin obtuse producto, apice late et oblique secto, stylo valde curvato munito.

Madagascar : Tamatave (*Camboué*).

Pachypoessa ⁽¹⁾ **albimana**, sp. nov. — ♂ long. 3 mill. — Cephalothorax niger, fulvo-pubescent (fere omnino depilis), ad marginem frontalem pilis albis paucis munitus, parte thoracica vitta media paulo dilutiore, postice albo-pilosa, ornata. Pili oculorum fulvo-rufescentes. Clypeus fere nudus. Abdomen breviter ovatum, fuscum, laete fulvonitido-pubescent, ad marginem anticum pilis albis munitum et vitta media dilutiore lata, postice tenuiter fusco-segmentata notatum. Chelae verticales et parallelae, nigrae, opacae et rugosae, marginibus sulci brevibus, inferiore dente mediocri, ad radicem unguis parum distante, munito. Partes oris fusco-castaneae, testaceo-marginatae. Sternum fulvum, longe albido-pilosum. Pedes antici reliquis robustiores, nigricantes, metatarsis castaneis, tarsis fulvis, longe et parce albo-criniti haud ciliati. Pedes postiei fuseo-rufuli, femoribus tibiisque utrinque obscurioribus. Pedes-maxillares parum longi, robusti, nigrimi sed tarso lato, crebre et longe niveo-hirsuto; femore curvato; tibia patella breviore, apophysa crassa sed apice breviter acuta et antice arcuata extus armata; tarso late ovato, obtuso, depressiusculo bulbum parum superante; bulbo magno sed simplici, disciformi et subrotundo, apice oblique secto et stylo brevi munito.

Africa occidentalis : Sierra-Leone (*Mocquerys*).

P. lacertosa, sp. nov. — ♂ long. 8-9 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica in medio late dilutiore et lineolis nigris obliquis et biseriatis, antice convergentibus notata, (fere omnino depilis) saltem utrinque rubro-pubescent. Pili oculorum supra oculos et extus rubri, subtus albi. Clypeus sat angustus, setis albis paucis longissimis et biseriatis, marginalibus decumbentibus, ornatus. Abdomen longum, supra fuscum, luteo-pubescent et lineolis quatuor rubro-pilosus ornatum, subtus atrum et parce cinereo-pilosum. Chelae sublaeves, vix striatae, nigrae, apice dilutiores et rufulae. Partes oris sternumque fusco-castanea. Pedes quatuor antici nigricantes, coxis castaneis, tarsis luteis, patellis tibiis metatarsisque subtus crebre et longe nigro-fim-

(1) **Pachypoessa**, nov. gen. — A *Phiale* differt metatarsis anticis tarsis haud longioribus, oculis posticis majoribus fere *Plexippi*. — Typus : *P. lacertosa* E. Simon.

briatis. Pedes quatuor postici castanei, coxis metatarsisque dilutioribus, tarsis luteis. Pedes-maxillares fuscii, nigro-setosi; patella tereti, paulo longiore quam latiore; tibia breviore et paulo latiore, extus ad marginem apicalem, apophysi brevi, robusta et dentiformi armata; tarsus sat longe ovato, teretiusculo; bulbo ad basin crassissimo, convexo et oblique truncato, ad apicem profunde fiso, ramulo interiore depresso et obtuso, exteriore fere parallelo sed apice abrupte acuto.

Africa austro-orient. : Natal (*Dr Ch. Martin*). — Madag. : Diego-Suarez (*Ch. Alluaud*).

Brancus ⁽¹⁾ **muticus**, sp. nov. — ♂ long. 6-7 mill. — Cephalothorax laevis, niger, parte thoracica antice vix dilutiore, (fere omnino depilis) parte cephalica utrinque rubro-pilosa. Pili oculorum breves albidi extus fulvi. Clypeus angustus, ad marginem pilis albis squamiformibus uniseriatis ornatus. Abdomen sat angustum et longum, supra nigerrimum, sed vitta media integra, postice sensim attenuata, crebre luteo-squamulata ornatum, subtus atrum, parce albo-pilosum. Chelae nigrae, validissime transversim plicatae et parce albo-squamulatae. Sternum et partes oris nigra, laminae intus anguste testaceo-marginatae. Pedes quatuor antici nigri, tarsus 2^o parisi luteo, tibiis subtus extus muticis intus aculeis minutissimis binis tantum armatis, parum dense nigro-ciliatis, metatarsis aculeis 2-2 minutissimis munitis. Pedes quatuor postici castanei, femoribus nigris, metatarsis ad apicem tarsisque luteis. Pedes-maxillares nigri, nigro-pilosii; tibia paulo latiore quam longiore apophysi submedia divaricata sat gracili atque acuta extus armata; tarsus sat longe ovato; bulbo magno, ad basin convexo et oblique truncato, ad apicem depresso et obtuso.

Africa occid. : Congo.

B. Blaisei, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax niger et nitidus (fere depilis) utrinque, pone oculum posticum, macula albido-luteo-squamulata ornatus. Pili oculorum laete rubri. Clypeus angustus nudus. Oculi antici magni a sese contigui, apicibus in linea rectam. Abdomen anguste ovatum, supra nigrum, obscure rubro-pubescent, vitta media integra laete albo-luteo-squamulata et nitida ornatum, subtus fusco-testaceum, vitta media obscuriore notatum, parce albo-pilosum. Chelae breves, sat latae et leviter divaricatae, nigro-nitidae, marginibus sulci sat longis, superiore ad angulum prominulo et den-

(1) **Brancus**, nov. gen. — Ab *Eugasmia* et *Evarcha* imprimis differt tibiis anticis subtus aculeis interioribus parvis 2 vel 3 munitis sed aculeis exterioribus parentibus. — Typus : *B. muticus* E. Simon.

tibus parvis binis a sese remotis munito, inferiore dente sat longo sed gracili armato, ungue longo. Pedes parum longi, nigricantes, tarsis cunetis, metatarsisque quatuor posticis fulvis. Pedes I^o paris reliquis robustiores, femore clavato et compresso, tibia subtus nigro-piloso, aculeis interioribus trinis uniseriatis, brevibus et robustis, subtus armata, metatarso brevi, tarso haud longiore, aculeis validis et obliquis 2-2 subtus munito. Pedes-maxillares nigri; femore sat gracili; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi tenui, longa, oblique divaricata et recta armata; tarso longo, late ovato, supra piano; bulbo magno, subrotundo, in tuberculo obtuso extus arcuato elevato, stylo rufulo tenui, circulos duos formante circumdato.

Africa occid., prope amnem « Komo » dictum (lieut. Blaise).

Sigytes ⁽¹⁾ **paradisiacus**, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax niger, fulvo-rufulo-pubescent, parte thoracica antice vitta semicirculari latissima fusco-rufula, albo-pilosa et linea marginali exili albo-pilosa ornata. Pili oculorum obscure rufuli. Clypeus fere glaber, setis longis paucis cinereo-nigris tantum munitus. Abdomen breve, fusco-testaceum fulvo-nitido-pubescent, antice linea arcuata albo-pilosa marginatum, dein vitta longitudinali obscure fulva, postice sensim dilutiore et nigricanti-marginata ornatum, subtus pallide luteum utrinque parcissime fusco-punctatum. Chelae sat longae, nigrae, opacae et transversim rugatae. Partes oris castaneae, laminae latae, extus turbinatae. Sternum coxaeque posticæ lutea, femora nigra quatuor postica ad basin late lutea, reliqui articuli pedum fulvi, tibiae metatarsique, praesertim antici, late fusco-annulati et parce albo-pilosii, aculei ordinarii numerosi. Pedes-maxillares breves nigricantes, patella lutea, femore ad apicem patella supra, tibia intus, crebre et crasse niveo-hirsutis; tibia apophysi gracili et subrecta extus armata; tarso ovato; bulbo nigro, magno, ad basin attenuato et sat longe retro-producto, ad apicem stylo valido, circulum formante, munito.

Ins. Taprobane : Galle !

A *S. scutato* (*Ergane*) L. Koch, cui affinis est, imprimis differt clypeo subglabro, pedum-maxillarium tarso bulboquo multo majoribus, etc.

Plexippus redimitus, sp. nov. — ♂ long. 6-8 mill. — Cephalothoracis pars cephalica nigra, albido fulvoque pilosa, thoracica in medio

(1) **Sigytes**, nov.gen. (*Ergane* L. Koch, ad part.) — A *Thiratoscyrto* differt metatarsis anticis aculeis lateralibus binis intus munitis, quadrangulo oculorum, superne viso, parallelo. — Typus : *S. paradisiacus* E. Simon.

atque ad marginem late fulvo-rufula et albo-pilosa, sed tenuiter nigro-cincta, utrinque, in declivitate, intense nigro-vellutina. Pili oculorum albidi, utrinque genis albis, vittis binis fusco-rubris sectis. Clypeus creberrime et longe albido-luteo-barbatus. Abdomen supra nigrum, vitta media lata, prope apicem linea exilio transversa cruciata, lutea et albo-pilosa, ornatum, subtus atrum, utrinque late albido-marginatum. Chelae verticales et parallelae, nigrae, valde coriaceae, intus, fere usque ad apicem, crebre et longe albido-luteo-hirsutae. Partes oris fusco-castaneae. Sternum coxaeque lutea, albo-pilosa. Pedes modice longi, robusti, fulvo-rufuli, femoribus patellis tibiisque fusco-variatis et sublineatis, femoribus 1^o paris subtus, tibiisque metatarsisque 4^o paris fere omnino nigris, nigro-hirsuti et parce albo-pubescentes, femoribus anticis pilis claviformibus albis subtus parce ornatis. Pedes-maxillares fulvi, femore intus infuscato, extus fasciculo apicali setarum ornato; patella vix aequa longa ac lata; tibia patella breviore, apophysi longa, recta, antice directa et dimidium tarsum superante extus armata; tarso latè, apice breviter sed valde attenuato; bulbo magno, fusco, paulo latiore quam longiore, intus stylo longo et subrecto munito.

Ins. Taprobane : Kandy !

P. tortilis. sp. nov. — ♂ long. 9 mill. — Cephalothorax laevis, fusco-castaneus, parte cephalica nigra, utrinque atque ad marginem frontalem fulvo-pilosa, postice macula transversa maxima albo-pilosa ornata, thoracica linea media exili fulvo-pilosa et antice, pone oculos, maculis parvis trinis albo-pilosis, transversim ordinatis, notata. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus fere nudus, parce cinereo-setosus. (Abdomen fere detritum.) Chelae longae, parallelae, sat angustae, nigro-castaneae, coriaceae et parce granulosae, glabrae, marginibus sulci sat brevibus, superiore ad angulum dentibus binis subgeminatis, 4^o majore, inferiore dente sat forti, armatis. Partes oris castaneae ad marginem dilutiores. Sternum luteum, antice sensim infuscatum. Pedes longi, fulvo-rufuli, quatuor antici leviter infuscati, sed coxis metatarsis tarsisque cunctis dilutioribus, metatarsis anticis tibiis non multo brevioribus, aculeis 2-2 subtus armatis et metatarsis 2^o paris aculeo lateralii interiore apicali munitis. Pedes-maxillares lutei, parce albo-pilosii, modice longi sed robusti; femore apice incrassato; patella parallela, circiter aequa longa ac lata; tibia patella paulo breviore, ad basin paulo angustiore, apophysi exteriore nigra, sat longa, gracili et depressa, divaricata sed antice valde sinuoso-recurva armata; tarso sat lato, sed apice longe attenuato; bulbo magno, depresso, circiter aequa lato ac longo,

ad basin breviter producto, ad apicem profunde diviso, ramulo extiore late rotundo, interiore longe producto atque acuto.

Africa occid. : Gabon.

P. coccineus, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax sat longus, parte cephalica nigra, crebre coccineo-pubescente, thoracica fulvo-rufula, parce albo-pilosa, vittis duabus latis et ovatis fuscis et coccineo-pilosis notata. Pili oculorum laete coccinei. Pili clypei longi et densi albido-lutei. Oculi antici inter se subcontigui, apicibus in lineam subrectam. Abdomen oblongum, supra luteo-testaceum, sat late fusco-marginatum, rubro-pubescentes, subtus fulvum. Chelae sat angustae et parallelae, nigrae, praesertim intus ad basin, crebre et longissime albido-luteo-hirsutae, marginibus sulci brevibus, dentibus, ad radicem unguis parum distantibus. Partes oris coxaeque anticae fusco-eastaneae. Sternum et reliquae coxae fulva. Pedes quatuor antici nigricantes, femoribus subtus dilutioribus, tarsis luteis. Reliqui pedes obscure fulvi, valde nigricanti-variati et sublineati, cuncti pilis albis, lineas formantes, ornati. Pedes-maxillares robusti, pallide lutei, crasse albido-luteo-hirsuti, femore ad basin infuscato, extus ad apicem fasciculo setarum munito; tibia patella breviore, apophysi apicali antice directa, sat longa, gracili et acuta, apice nigra et leviter incurva, extus armata; tarse late ovato; bulbo magno, nigro, ad basin conico, intus stylo valido et subrecto munito.

Turcomania.

P. rubrogularis, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax niger, pilis fulvo-rufulis vestitus, parte thoracica linea media exili abbreviata, utrinque vitta lata arcuata; lineaque marginali exili albo-pilosis decorata. Pili oculorum et clypei creberrimi coccinei. Abdomen oblongum, supra nigrum, albo-marginatum et vitta media angusta et integra alba ornatum, subtus atrum, vitta media albo-pilosa latiore sed postice attenuata notatum. Sternum fuscum, parce albo-pilosum. Chelae sat breves, leviter coriaccae, fulvo-rufulae, intus ad basin crebre et grosse luteo-squamulatae. Pedes obscure fulvi, albo nigroque pilosi, antici, tarsis exceptis, valde infuscati. Tibiis subtus crebrius sed breviter pilosis, postici femoribus ad apicem, tibiis metatarsisque ad basin atque ad apicem, fusco-annulatis. Pedes-maxillares fulvi, albo nigroque hirsuti; tibia patella breviore et paulo angustiore, apophysi apicali crassa sed attenuata et apice minutissime bitida, extus armata; tarse sat anguste ovato; bulbo simplici, postice breviter producto atque acuminato.

Transvaal : Makapan !

Artabrus ⁽¹⁾ **Jolensis**, sp. nov. — ♂ long. 43 mill. — Cephalothorax crassus et altus, fusco-castaneus, parte cephalica nigra, parce rubro-pilosa, utrinque sub oculis et antice pone oculos medios, albo-luteo-pilosa subsquamulata. Pili oculorum rubri. Clypeus fere glaber, parce nigro-setosus. Abdomen longum, teretusculum (fere omnino depile) supra fuscum, duriusculum et nitidum, sed antice late dilutius et testaceum, in medio albo-nitido utrinque fulvo squamulatum, subtus fusco-testaceum. Chelae validissimae, attenuatae et divaricatae, antice nigrae, opacae et parce striolatae, subtus in medio convexae et valde striatae, marginibus sulci longis, depresso et obtuse carinatis, inferiore dente longo et acuto remotissimo armato, ungue longissimo, valde curvato fere semicirculari. Partes oris nigrae et opacae. Sternum pedesque fulvo-rufula, patellis tibiisque quatuor anticis, metatarsoque 1^o paris apice late nigricanti-annulatis, patella tibiaque 3^o paris apice leviter infuscatis. Pedes-maxillares graciles et longi, lutei; tibia-patella paulo longiore, tereti, extus, ad apicem. apophysi nigra parva et acuta, antice directa, armata; tarsio tibia vix longiore et vix latiore; bulbo simplici, disciformi, subrotundo, nigro.

Ins. Jolo.

Pseudamycus protervus, sp. nov. — ♂ long. 9 mill. — Cephalothorax niger, fulvo-nitido pubescens, utrinque, in declivitate vitta latissima postice incurva albo-pilosa ornatus. Pili oculorum laete rubro coccinei. Clypeus sub oculis crebre et inordinate albo-barbatus, ad marginem pilis albis longioribus crebre seriatis ornatus. Abdomen fusco-testaceum, supra parce nigricanti-variatum in albido-pubescent, subtus vitta media lata nigra notatum. Chelae fusco-rufulæ, leviter striatae, ad basin albo-crinitæ, convexæ et leviter incurvæ, intus ad apicem dente parvo armatae, marginibus sulci brevibus, inferiore dente valido compresso leviter oblique seto instructo. Pedes fusco-castanei rubro-pilosæ, albo nigroque hirsuti, tarsis dilutioribus, femoribus praesertim anticis, metatarsoque 1^o paris nigricantibus, metatarso 1^o paris brevi et curvato, subtus nigro-fimbriato aculeis longis 2-2 atque, utrinque in parte basali aculeo lateralí multo minore armato, metatarso 2^o paris utrinque aculeis lateralibus bimis munito. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco-castanei, tarso apice dilutiore; tibia patella

(1) **Artabrus**, nov. gen. — A *Pseudamycus* differt pedibus 3^o paris (patella excepta) pedibus 4^o paris haud longioribus, tibiis cylindraceis, chelis maris longis et proclivibus. — Typus : *Plexippus erythrocephalus* C. Koch.

longiore, tereti, utrinque longe sed parce albo-hirsuta, apophysi apicali gracili recta et acuta extus armata; tarsò tibia breviore ad basin vix latiore apice attenuato; bulbo simplici, disciformi, intus stylo libero recto munito.

Singapoore!

Pharacocerus⁽¹⁾ sessor, sp. nov. — ♂ long. 6-7 mill. — Cephalothorax (depilis) fusco-castaneus, antice paulo dilutior sed prope oculos niger. Pili oculorum pauci, fulvi vel lutei. Clypeus nudus. Abdomen breve, depressiusculum, postice acuminatum, supra crebre luteo-roseo vel albido-pubescent et parce hirsutum, sed macula maxima nigro-velutina, longe rhomboidal, postice abrupte angustiore et truncata, ornatum, subtus obscure fulvum, albido-luteo-pilosum. Chelae fusco-castaneae, glabrae, subtiliter striatae, cylindraceae et leviter divaricatae, ad apicem, supra radicem unguis, tuberculo obtuso brevi et infra directo, subtus, sub unguis, tuberculo obtuso vel costa arcuata instructae, margine superiore dentibus binis mediocribus et remotis sed inter se subgeminatis, 1^o 2^o majore, margine inferiore dente maximo et acuto, instructis. Sternum coxaeque pallide fusco-rufula. Partes oris pedesque quatuor antici fusco-castanei, femoribus nigris, metatarsis dilutioribus, tarsis luteis, pedes quatuor postici dilutiores, cunei parce et longe hirsuti, tibiis supra maculis parvis albido-pilosis biseriatis 2-2 ornatis. Pedes-maxillares parum robusti, sat longi, fusco-castanei, tibia tarsoque nigris; tibia patella paulo breviore et angustiore sed longiore quam latiore, apophysi antice directa sat longa, in parte apicali angusta et leviter divaricata, extus armata; tarsò sat breviter ovato: bulbo simplici, disciformi, subrotundo.

Madagascar : Ste-Marie (*Morquerys*).

Malloneta⁽²⁾ guineensis, sp. nov. — ♂ long. 7-9 mill. — Cephalothorax fulvo-ravidus, parte cephalica nigra, sat longe luteo-pubescent sed ad marginem frontalem plus minus late roseo-aurantiaco-

(1) **Pharacocerus**, nov. gen. — A *Plexippo* imprimis differt metatarsis posticis verticillo aculeorum basali ex aculeis quatuor, lateralibus 2 inferioribus 2, a *Pseudamyco* et *Artabro* differt metatarsis 2^o paris aculeo laterali apicali munitis. — Typus : *P. sessor* E. Simon.

(2) **Malloneta**, nov. gen. — A *Pseudamyco* differt metatarsis quatuor posticis tibiis longioribus, aculeis debilioribus armatis, chelis maris validis, divaricatis, marginibus sulci longis et depressis, inferiore dente valido et remoto munito. — Typus : *M. guineensis* E. Simon.

pilosus. Pili oculorum supra oculos aurantiaci, subtus, pauci et breves, albidi. Clypeus glaber. Abdomen angustum et longum, supra fulvo-rufulum et albo-marginatum, vittis binis aurantiaco-pilosis vittaque media albo-pilosa, prope apicem fusco-marginata, ornatum. Chelae validae, convexae et divaricatae, fusco-rufulæ, nitidae, parce transversim striolatae, marginibus sulci longis, depressis, inferiore dente remoto valido et acuto, armato, ungue longo, subtus ad apicem oblique secto et minute anguloso. Partes oris fusco-rufulæ. Sternum luteum. Pedes antici fusco-rufuli, ad basin atque ad apicem dilutiores, tibiis subtus breviter et parce fimbriatis. Pedes postici lutei, femoribus ad apicem tibiaque 3ⁱ paris leviter infuscatis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, sat longi et parum robusti: tibia patella vix breviore, paulo graciliore, intus nigro extus albo-crinita, extus ad apicem apophysi gracili et arcuata, apice depressa et truncata, armata: tarsio angusto; bulbo simplici, ovato, ad basin breviter et oblique producto, intus stylo valido nigro et subrecto marginato.

Africa tropica occidentalis.

Phaulostylus ⁽¹⁾ **furcifer**, sp. nov. — ♂ long. 7·9 mill. — Cephalothorax obscure rubro-castaneus, aurantiaco-pubescent, utrinque, prope oculos, niger, glaber et nitidus, vitta submarginali lata, in parte thoracica linea media exili sed antice, inter oculos, ampliata, albo-pilosis, decoratus. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus angustus parce et longe albo-pilosus. Abdomen longe oblongum, testaceum, supra albo-pubescent et vittis latis binis, antice evanescentibus rubro-pilosis, ornatum. Chelae longissimæ et porrectæ, supra planæ, obtusissime bicostatae, nigro-aeneæ, intus setis spiniformibus erexit brevibus crebre vestitæ, margine inferiore sulci, in parte apicali, leviter emarginato et dentibus parvis aequis, transversim ordinatis, armato, margine superiore dente maximo inaequaliter bifido, ramulo anteriore acuto et recto, altero, saltem duplo longiore, postice curvato et apice minute furcate, ungue longissimo, leviter ovato et compresso. Partes oris, sternum, pedesque quatuor anteriores, fusco-castanea, patellis anticis longis, tibiis metatarsisque aculeis inferioribus lateralibusque armatis. Pedes quatuor postici obscure fulvi, femoribus infuscatis. Pedes-maxillares rubro-castanei, sat graciles et longi; tibia patella saltem aequilonga, paulo graciliore, tereti, extus ad apicem apophysi nigra, brevi et obtusissima

(1) **Phaulostylus**, nov. gen. — A *Colytto* (Thorell) differt tibiis cunctis aculeo dorsali carentibus, laminis maris sat angustis extus obtusis. — Typus: *P. furcifer* E. Simon.

munita; tarsو anguste ovato; bulbo ovato, ad basin anguste producto et curvato, ad apicem stylo libero obliquo munito.

Madagascar : sinus « Antongil » dictus (*Mocquerys*).

P. Grandidieri, sp. nov. — ♂ long. 7 mill. — Cephalothorax obscure rubro-castaneus, parte cephalica infuscata et maculis latis nigris utrinque notata, supra fulvo-nitido in lateribus aurantiaco-pubescenti et vitta media nivea ornata, parte thoracica antice dilutiore et rubro-pilosa sed vitta marginali lata albo-pilosa cincta. Pili oculorum supra et inter oculos aurantiaci, subtus albi. Glypheus crebre et longe albo-barbatus. Abdomen supra pallide testaceum, utrinque linea exili flexuosa, in medio vitta latiore et aurantiaco-marginata, albo-pilosus, ornatum, subtus obscure testaceum, fere glabrum. Chelae convexae et leviter divaricatae, sed verticales, antice nigro-aeneae, pilis albis longis hirsutae, marginibus sulci sat longis et depresso, dentibus medioribus remotis. Partes oris nigricantes, testaceo-marginatae. Pedes fulvi, femoribus, praesertim anticis, infuscatis, tibiis metatarsisque anticis apice late infuscatis et tibiis annulo medio albo-piloso, ornatis. Pedes-maxillares longi et graciles, fulvo-rufuli, parce albo-pilosii; femore longo curvato; patella saltem duplo longiore quam latiore utrinque uniaculeata; tibia patella circiter aequilonga paulo graciliore, tereti, apophysi apicali simplici et acuta extus armata; tarsо anguste ovato, tibia paulo longiore, non multo latiore; bulbo longo, ad basin attenuato breviter et obtuse producto, ad apicem stylo parvo et uncato munito.

Madagascar : St^e-Marie.

P. grammicus, sp. nov. — ♂ long. 7-10 mill. — Cephalothorax altus, laevis, parte cephalica nigra utrinque flavo-pilosa et macula media albo-pilosa ornata, parte thoracica fusco-rufula, marginem versus sensim obscuriore, linea media abbreviata, vittaque marginali lata, postice interrupta, albo-pilosus ornata. Pili oculorum flavo-aurantiaci, pili clypei et genarum albi, longi et densi. Abdomen angustum, postice acuminatum, parce et longissime cinereo-crinitum, supra nigrum, vitta media integra et utrinque vitta marginali testaceis et albo-pilosus decoratum, subtus fulvo-testaceum. Chelae modice longae, crassae et divaricatae, ad basin et extus valde convexae, apice attenuatae, nigrae, coriacae, antice in convexitate crebre et longe albido-crinitae, marginibus sulci longis depresso, dentibus medioribus remotis, superioribus leviter prominulis binis geminatis, 1^o 2^o plus duplo majore et curvato, ungue valido et longo, subtus, in medio, leviter convexo.

Partes oris nigro-castaneae. Sternum coxaeque lutea. Pedes, praesertim antici longi, pallide fulvi, femoribus anticis usque ad basin, posticis ad apicem, late nigranti-vittatis, patellis rufescensibus, tibiis metatarsisque apice nigro-annulatis, aculeis numerosis armati, sed tibiis aculeo dorsali carentibus. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco castanei, longe cinereo-criniti et parce albo-pilosii; femore curvato; patella plus duplo longiore quam latiore, utrinque uniaculeata; tibia patella paulo longiore, graciliore et tereti, extus ad apicem apophysi simplici, conica et oblique divaricata armata; tarso tibia vix longiore, longe fusiformi; bulbo longo, ad basin breviter et subacute producto, ad apicem profunde fisso, lobo exteriore nigro et obtuso, interiore aequinato, apice stylo parvo et subrecto munito.

Madagascar : Antongil (*Mocquerys*).

P. leucolophus, sp. nov. — ♀ long. 7-8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica, saltem prope oculos, fere nigra, rubro-pilosus, vitta media, marginem frontalem haud attingente, sat lata, postice sensim attenuata, vittaque submarginali, postice interrupta, niveo-pilosis ornatus. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus angustus, pilis niveis, valde clavatis et pediculatis, conspersus. Abdomen supra fuscum vel obscure testaceum, rubro-pubescent, linea marginali angusta vittaque media paulo latiore et integra testaceis et albo-pilosis ornatum, subtus fuscum. Chelae nigro-castaneae, transversim striolatae, extus glabrae, intus sat crebre et tenuiter albido-pilosae, longissimae (cephalothorace saepe vix breviores), attenuatae et valde divaricatae, marginibus sulci longissimis, leviter depresso et carinulatis, utrinque ad apicem, prope radicem unguis, tuberculo compresso subacuto et dentiformi armatis, dentibus remotissimis, margine superiore, an angulum leviter prominulum, dentibus parvis trinis, inferiore dente longiore sat gracili atque acuto, armatis, ungue longissimo tereti, bisinuoso. Partes oris, sternum coxaeque fusco-castanea. Pedes fulvo-rufescentes, femoribus plus minus infuscatis, aculeis numerosis ut in praecedenti ordinatis, instructi. Pedes-maxillares fusco-castanei, femore supra setis niveis uniseriatis erectis longis crassis et obtusis insigniter ornato, patella tibiaque extus rubro-pilosus, longissimi et graciles; femore curvato; patella cylindracea, plus triplo longiore quam latiore; tibia paulo longiore vel saltem haud brevior, paulo graciliore, apophysi nigra depressa et obtusa, brevi et leviter extus arcuata, munita; tarso parvo; bulbo simplici, ovato, ad basin retro-producto, obtuso atque arcuato.

Madagascar : Antongil (*Mocquerys*).

Colopssus ⁽¹⁾ **cancellatus**, sp. nov. — ♂ long. 7-10 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, utrinque, prope oculos, niger, parte cephalica squamulis, parvis et pronis, laete roseo-micantibus, squamulis viridibus paucis mixtis, crebre vestita. Pili oculorum pauci albidii. Clypeus fere glaber. Abdomen longum et angustum, depresso-sculptum, supra fuscum, crebre et minute rubro-squamulatum, linea media integra, utrinque, praesertim antice, lineolis numerosis obliquis et arcuatibus flavidio-nitido-squamulatis ornatum, subtus atrum, parce albo-pubescent, utrinque albo-striatum. Chelae fusco-castaneae, ad basin et extus laeves, intus inaequales et coriaceae, pilis albis longis, leviter clavatis, conspersae, maximae et divaricatae sed valde attenuatae, marginibus sulci longis et depressis, superiore dente remotissimo magno, longo et acuto denteque multo minore, inferiore dente minore, aequaliter remoto atque ad apicem, prope radicem unguis, tuberculo parvo et obtuso armatis, ungue longo et valido, ad basin cylindrato, ad apicem compresso, supra pone medium minute tuberculato. Partes oris fusco-castaneae. Sternum pedesque fulva. Pedes quatuor antici, metatarsis tarsisque fulvis exceptis, castanei, femoribus nigris, tibiis anticis subtus breviter et parce nigro-ciliatis et supra linea nigro-pilosa notatis, aculeis numerosis ut in *Colytto* ordinatis, instructi, sed tibiis quatuor posticis aculeo dorsali carentibus. Pedes maxillares fulvi, longi et graciles; patella plus triplo longiore quam latiore; tibia patella paulo longiore et graciliore, tereti, apophysi apicali parva, nigra, compressa et acuta, extus armata; tarse tibia paulo breviore, vix latiore, tereti et obtuso; bulbo basin tarsi tantum occupante, parvo et subrotundo, apice stylo sat crasso obliquo et recto munito.

♀ long. 8-12 mill. — Cephalothorax rufescens, parte cephalica nigra vel castanea, rubro-pubescent, valde albo-variegatus et lineatus, parte cephalica linea media, utrinque lineis curvatis binis, thoracica antice macula triquetra, postice atque in lateribus lineis numerosis curvatis et divaricatis. Pili oculorum et clypei albi pauci et longi. Abdomen supra nigerrimum, in medio atque ad apicem dilutius et rubro-pubescent, in parte basali lineolis numerosis et flexuosis albido-luteis clathratum, in medio vitta longitudinali abbreviata lineaque transversa tenui albido-luteis, in parte apicali puncto medio niveo et utrinque

(1) **Colopssus**, nov. gen. — A *Colytto* et *Phaustostylo* differt tegumentis crebre et minute squamulatis, clypeo (maris) fere nudo, tibiis quatuor posticis aculeo dorsali carentibus, bulbo maris disciformi ad basin haud producto. — Typus : *C. cancellatus* E. Simon.

vitta lata, apicem haud attingente, albido-lutea apice alba, structe decoratum, subtus obscure testaceum fere glabrum. Chelae fusco-rufulae, parce rugatae, longe albo-hirsutae. Sternum pedesque fulvo-rufula. Plaga genitalis ovato transversa, utrinque foveola parva nigro-marginalia, in medio plagula olivacea, obtuse triquetra, notata.

Ins. Taprobane : Kandy ! Galle !

Pancorius (¹) **naevius**, sp. nov. — ♂ long. 7-10 mill. — Cephalothorax niger rubro-pubescent, parte cephalica postice, inter oculos, macula vel vitta transversa albo-pilosa ornata. Pili oculorum lacte rubri. Clypeus imberbis. Abdomen breviter ovatum, supra nigrum et parce rubro-pubescent, vitta media integra et lata testacea albo-pilosa et tenuiter rubro-marginata ornatum, subtus atrum utrinque vitta albido-pilosa marginatum. Chelae latae, robustae et convexae, valde coriaceo-striolatae, nigro-castaneae, glabrae, antice muticæ, marginibus sulci sat longis, superiore ad angulum dentibus binis geminatis, 1^o majore et obtuso, inferiore dente mediocre et acuto armatis, ungue longo, supra, prope medium, paululum convexo. Partes oris, sternum coxaeque fusco-castanea. Pedes robusti fulvo-rufuli, antici patellis metatarsis et praesertim tibiis valde infuscatis et castaneis, tibiis metatarsisque pilis longis, ad basin nigris ad apicem albis, subtus crebre vestitis. metatarso 1^o paris tibia paulo breviore, aculeis inferioribus 2-2 atque intus aculeis lateralibus binis minoribus, metatarso 2^o paris aculeis lateralibus binis parvis, instructis. Pedes-maxillares tenues et longi, lutei, intus pilis nigris extus pilis albis longis parum dense vestiti; patella plus triplo longiore quam latiore; tibia patella longiore et paulo graciliore, tereti, extus ad apicem apophysa nigra leviter compressa sed acuta, subrecta et antice directa, armata; tarso tibia breviore et vix latiore; bulbo parvo, simplici, disciformi, apice stylo tenui et subrecto munito.

Java : Palabuan (*Fruhstorfer*).

P. scoparius, sp. nov. — ♂ long. 8-9 mill. — Cephalothorax niger, pilis simplicibus obscure rubris parce vestitus. Pili oculorum fulvo-rubri. Clypeus sat angustus, crebre albo-luteo-barbatus. Oculi antie apicibus in lineam subrectam. Abdomen sat breviter ovatum, supra nigrum, utrinque parce rubro-pubescent, vitta lata et integra,

(1) **Pancorius**, nov. gen. — A *Plexippo* differt, area oculorum dorsum parallelæ, chelarum dente inferiore parvo. — Typus : *Ergane dentichelis* E. Simon.

crebre et simpliciter flavo-nitido-pilosa et tenuiter rubro-marginata ornatum, subtus utrinque flavido-pubescentia, vitta media latissima fusca, postice attenuata, notatum. Chelae validae, nigrae, antice valde coriaceae et striolatae, marginibus sulci longis, inferiore dente remotissimo parvo armato. Partes oris sternumque obscure fusca. Pedes lutei, patella tibiaeque 1^o paris valde infuscatis fere nigris, tibia pilis longis, ad basin nigris ad apicem albis, subtus crebre fimbriata, metatarso pilis paucis albidis longissimis et curvatis ornato, aculeis inferioribus munito sed aculeis lateralibus carente. Pedes-maxillares olivacei, longi et graciles: tibia patella paulo longiore et graciliore, utrinque longe crinita, apophysi apicali tenui, longa, antice directa, apice leviter incurva extus armata; tarso tibia circiter aequilongo, ad basin paulo latiore, ad apicem longe attenuato; bulbo simpliei, disciformi, basin tarsi tantum occupante, intus stylo sat longo tenui et subrecto armato.

Java : Pengalengan (*Fruhstorfer*).

P. borneensis, sp. nov. — ♂ long. 8 mill. — Cephalothorax niger, rubro-pubescentia, parte cephalica postice, inter oculos, macula maxima flavido-nitido-pilosa decorata. Pili oculorum laete rubri. Clypeus imberbis. Oculi antici inter se contigui, apicibus in lineam rectam. Abdomen sat breviter ovatum, supra nigrum, vitta integra flavido-pilosa et tenuiter rubro-marginata ornatum, subtus nigrum et subglabrum sed utrinque vitta flavido-pilosa marginatum. Chelae sat angustae et longae, fere parallelae, nigro-castaneae, valde coriaceo-rugosae atque opacae, supra ad apicem dente valido sed acuto et arenato intus directo instructae, marginibus sulci brevibus, inferiore dente parvo, ad radicem unguis parum remoto, munito. Partes oris sternum coxaeque fusco-olivacea. Pedes lutei, patella metatarso et praesertim tibia 1^o paris infuscatis subtus pilis nigris pilisque albis longioribus vestitis, metatarsis quatuor anticis, tibiis haud vel vix brevioribus, aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis, multo minoribus, instructis. Pedes-maxillares graciles et longi, lutei, fere praecedentis, sed bulbo paulo majore.

Borneo (ex mus. G. et E. Peckham).

Alfenus (¹) **calamistratus**, sp. nov. — ♂ long. 9 mill. — Cephalo-

(1) **Alfenus**, nov. gen. — A *Thiratoscyrto* differt pedibus 3^o et 4^o paris a sese circiter aequilongis (tibia 3^o paris breviore), cephalothorace longiore, laminis maris extus obtusis, chelis maris sat debilibus, dente inferiore mediocri. — Typus : *A. calamistratus* E. Simon.

thorax crassus sed ovatus et sat longus, fuscus, fusco-pubescent, vitta media latissima, in parte cephalica lanceolata, in parte thoracica divisa et evanescente, vittaque marginali, leviter sinuosa et postice interrupta, albo-pilosis ornatus, parte cephalica utrinque, prope oculos, atque ad marginem frontalem aurantiaco-pilosa, et supra oculos ser. 2^e fasciculo setarum fuscarum crasso et erecto insigniter ornata. Pili oculorum laete aurantiaci, inter oculos medios longiores et albi. Clypeus angustus, subglaber, sed in medio area albo-pilosa munitus. Abdomen ovatum, supra fuscum, albo-pubescent, parce rufulo-punctatum et setis albis longissimis paucis conspersum, antice vitta longitudinali angusta rubra, postice utrinque maculis binis parvis et obliquis albidioribus notatum, subtus dilutius sed vitta media latissima obscuriore notatum. Chelae parallelae, fulvo-rufulae, sublaeves, extus parce albido-crinitae, margine inferiore sulci dente sat longo et obliquo armato. Partes oris fusco-castaneae apice paulo dilutiores, laminae extus rotundae. Sternum fulvum. Pedes obscure fulvi, antici femoribus supra tibiisque infuscatis, fusco rubroque pilosis, tibiis subtus paulo longius et crebre nigro-crinitis, metatarsis ad basin luteis et albo-pilosus ad apicem nigris, tarsis luteis et albo-pilosus, reliqui pedes supra valde fusco-variati et subannulatis, annulis maculisque parvis albo-pilosus ornati. Metatarsus 1^o paris rectus, tibia vix brevior, aculeis inferioribus sat longis 2-2 et utrinque aculeo apicali minore, metatarsus 2^o paris aculeis inferioribus et utrinque aculeis lateribus parvis binis instructi. Pedes-maxillares robusti, lutei, crasse et longe albo-hirsuti; femore curvato; patella vix longiore quam latiore; tibia patella breviore, apophysi nigra, crassa obtusa et valde curvata extus armata; bulbo maximo, ovato sed parum convexo, ad basin obtuse truncato, apice parum attenuato atque ad angulum interiorem anguloso-dilatato.

Congo.

Freya (¹) **exculta**, sp. nov. — ♂ long. 6-8 mill. — Cephalothorax nigro-nitidus, margine frontali luteo pilosò, parte thoracica utrinque in declivitate macula magna ovata luteo-pilosa ornata. Pili oculorum supra flavidi sub oculis albi. Clypeus sat angustus, setis albis longis paucis uniseriatim munitus. Abdomen ovatum postice acuminatum, nigrum, pilis brevibus albis, antice sensim luteo-tinctis, supra crebre vestitum et vittis duabus latis, marginem anticum haud attin-gentibus, coccineo-pilosus, decoratum, subtus albido-cinereo-pubescent.

(1) *Euophrys* subgen. *Freya* C. Koch, 1850 = *Heraclea* G. et E. Pekham nom. præocc.

Chelae parallelae, convexae, nigro-nitidae fere glabrae, marginibus sulci sat brevibus, superiore dentibus binis 4^e majore, inferiore dente superiore simili armatis. Partes oris nigro-castaneae, laminae extus subacute turbinatae. Sternum fusco-rufulum. Coxae fulvae. Pedes quatuor antici reliquis robustiores, femoribus clavatis, nigricantibus, metatarsis tarsisque fulvis, metatarsis tibiis brevioribus aculeis validis et longis 2-2 subtus armatis et metatarso 2ⁱ paris aculeo parvo lateraliter apicali intus munito. Pedes postici obscure fulvi, fusco-variati et subannulati. Pedes-maxillares breves et robusti, intense nigri, femore ad apicem patellaque supra laete albo-argenteo-pilosus; tibia latiore quam longiore, apophysi sat gracili, longa, valde curvata et subangulosa, apice minute bifida, extus armata; tarso breviter ovato; bulbo magno, ad basin crasse et obtusissime producto, intus stylo obliquo et longo munito.

Amazonas sup. : S. Paulo de Olivenga (*de Mathan*).

F. chionopogon, sp. nov. — ♂ long. 7 mill. — Cephalothorax obscure fusco-rufescens, parte cephalica nigra, utrinque, prope oculos, pilis albido-luteis, ad marginem frontalem pilis rubris ornata, parte thoracica laete rubro-pilosa sed prope marginem fere glabra. Pili oculorum aurantiaci, sub oculis mediis albi. Clypeus crebre et longissime albo-barbatus. Abdomen sat angustum, atrum, supra crebre, subtus parcus, luteo-olivaceo-pubescent, versus marginem anticum sensim et leviter dilutius et saepe utrinque, in parte apicali, puncto albido ornatum. Chelae nigrae, valde transversim rugatae, crebre et longe albo-hirsutae, marginibus sulci sat longe obliquis, superiore dentibus parvis binis, a sese late distantibus, inferiore dente mediocri armatis. Partes oris fusco-castaneae, laminae extus dilatatae sed obtusae. Sternum coxaeque pallide fusco-rufula. Pedes quatuor antici reliquis paulo robustiores, fere nigri, tarsis luteis, tibiis metatarsisque subtus longe et tenuiter pilosis, metatarsis, tibiis brevioribus, subtus aculeis validis et longis 2-2 et metatarso 2ⁱ paris aculeo lateraliter apicali, armatis. Pedes quatuor postici dilutiores. Pedes-maxillares fusco-castanei, mediores: tibia patella paulo breviore et angustiore, margine apicali cariniformi, leviter dilatata et fissa extus munita; tarso sat longe ovato; bulbo longo, ad basin attenuato et breviter producto, ad apicem stylo longo subrecto intus munito.

♀ long. 8 mill. — Cephalothorax obscure fusco-castaneus fere niger, laete rubro-pubescent sed postice, versus marginem, fere glaber, linea media exili, antice abbreviata, utrinque vitta marginali lata, postice late interrupta et saepe maculis frontalibus parvis trinis flavido-pilosis

decoratus. Pili oculorum et clypei albidi. Chelae antice longe albo-pilosae. Abdomen fuscum, flavido-olivaceo-pubescent, vitta media paulo dilutiore dentata, in parte basali utrinque tenuiter fusco alboque marginata, praeterea tenuissime transversim segmentata, et utrinque puncto albo, supra ornatum. Pedes fulvo-rufuli, antici plus minus infuscati.

Regio Amazonica (*de Mathan*).

F. perelegans, sp. nov. — ♂ long. 5-6 mill. — Cephalothorax niger, fulvo-olivaceo-pubescent, vitta frontali lata, transversa, vitta longitudinali, frontem haud attingente, antice lanceolata, vittaque marginali lata niveo-pilosis decoratus. Pili oculorum laete flavi vel aurantiaci. Pili clypei creberrimi nivei. Abdomen breviter ovatum, supra nigrum, anguste albo-marginatum et vitta media integra sat lata testacea et niveo-pilosa ornatum, subtus atrum, testaceo-marginalum, albido-pubescent. Chelae verticales et parallelae, nigrae vel castaneae, striatae, in parte basali, praesertim intus, pilis albidis tenuibus longis et decumbentibus hirsutae. Partes oris nigricantes, laminae extus prominulae sed obtusae. Sternum pedesque obscure fulvo-rufula, albo-pilosa et hirsuta, pedes quatuor antici, tarsis exceptis, fere nigri, aculeis validis et longis ordinariis sed metatarsis quatuor antieis aculeo laterali parvo apicali intus munitis. Pedes-maxillares crassi et breves, castanei, femore subtus nigro, supra cum patella crasse niveo-piloso; femore brevi, compresso et curvato; tibia brevissima, apophysi apicali gracili antice directa, recta sed apice minute uncata extus armata; tarse late ovato sed valde et sat longe attenuato; bulbo magno, saltem haud longiore quam latiore, intus stylo subrecto munito.

Venezuela : Caracas ! Orinoco.

Pochyta major, sp. nov. — ♂ long. 8 mill. — Cephalothorax brevis et altus, parte cephalica nigra, thoracica fusco-castanea, antice dilutiore et albido-pilosa. Pili oculorum et clypei pauci et breves albi. (Abdomen detritum.) Chelae parum longae sed validae, convexae et divaricatae, nigro-nitidae, et, praesertim intus, albido-crinitae, marginibus sulci longis et depresso, dentibus remotis, superioribus binis, parvis a sese distantibus, inferiore multo majore et acuto, ungue longo et compresso, nigro, apice rufulo, subtus, prope apicem, minute dentato. Partes oris nigricantes, laminae sat longae, extus obtusae. Pedes longi et graciles, antici postieis vix robustiores, laete fulvo-rufuli, metatarsis tarsisque quatuor antieis fere nigris, tibiis antieis aculeis inferioribus longissimis et pronis, intus 4 extus 3 (basin articuli attin-

gentibus), aculeisque lateralibus minoribus utrinque binis, metatarsis tibiis brevioribus, aculeis inferioribus longissimis et pronis 3-3 et utrinque lateralibus binis multo minoribus, insigniter armatis. Pedes maxillares graciles, fusco-castanei; tibia patella paulo breviore et angustiore, apophysibus nigris parvis binis, 1^a truncata cum angulo inferiore acuto, altera (apicali) uncata, extus armata: tarso anguste ovato; bulbo simplici, ovato, intus stylo subrecte munito.

Africa occid. : Gabon.

P. occidentalis, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos niger, parte thoracica vitta lata semicirculari, in medio valde ampliata, fulva et albo-pilosa ornata. Pili oculorum albi. Clypeus ad marginem vitta albo-barbata ornatus. Abdomen breve, atrum, lineis binis exilibus et antice, linea simili sed abbreviata, longe albo-pilosus supra ornatum, subtus paulo dilutius et albo-pubescent. Chelae verticales et fere parallelae, marginibus sulci sat longis dentibus medioeribus remotis, ungue simplici nec inflato nec serrulato, fusco-rufulae, antice opacae et parce albo-crinitae. Partes oris sternumque fusca. Pedes lutei, tibiis metatarsisque anticis paulo obscurioribus et rufescenti-tinctis, aculeis longissimis et pronis subtus armatis. Pedes maxillares graciles, sat longi, fusco-olivacei, albo-pilosi; tibia patella paulo longiore, apophysi apicali brevi sat lata, compressa, leviter deorsum curvata, cum angulo superiore subacuto, extus armata: tarso angusto et longo; bulbo breviter ovato, apice spina longa et curvata armata.

Africa occid. : Gabon.

A *P. (Viciria) pulchra* Thorell, cui affinis est, differt tibia pedum-maxillarium patella non multo longiore, apophysi apicali leviter curvata armata et ungue chelarum simplici ad basin haud inflato.

P. albimana, sp. nov. — ♀ long. 5 mill. — Cephalothorax laevis, subtilissime coriaceus, niger, utrinque in declivitate fulvo-rufulus, parte thoracica vitta media fulvo-rufula et albo-pilosa ornata, parte cephalica, saltem prope oculos, coccineo-pilosa. Pili oculorum coccinei. Clypeus fere nudus. Abdomen ovatum, postice acuminatum, supra nigrum et parce rufulo-pilosum, vitta media dilutiore valde coaretata et pennata, maculas parvas nigras includente, ornatum, subtus fulvo-olivaceum, linea media nigra notatum. Chelae, partes oris, sternum, pedesque fulvo-rufula. Pedes-maxillares graciles, pallide lutei, apice

parce albo-pilos. Plaga genitalis magna, rufula, semicircularis, utrinque fovea superficiali semilunari et extus emarginata, impressa.

Madagascar (*Camboué*).

Thiratoscyrtus versicolor, sp. nov. — ♂ long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, prope oculos late niger, parte cephalica aeneopubescenti, antice parum dense albo-pilosa, utrinque, inter oculos, laete rubro-coccineo-pilosa, parte thoracica vitta media confusa abbreviata vittaque marginali latissima, postice interrupta, albo-pilos, ornata. Pili oculorum aurantiaci, inter oculos medios et subtus albolutei. Clypeus pilis crassis sat longis luteo-albidis in medio crebre vestitus. Abdomen ovatum, supra nigritum, fusco rubroque pubescens, vitta marginali vittaque media lata et postice dentata fulvo-testaceis et albo-pilosis decoratum, subtus fusco-testaceum, parce pilosum, postice macula obscuriore confusa notatum. Chelae fulvo-rufulæ, nitidae, vix striatae, fere glabrae, sat latae et fere parallelæ, dentibus mediocribus, ungue simplici. Partes oris fulvae, ad basin leviter infuscatae. Sternum luteum nitidum. Pedes fulvo-lutei, vix distincte annulati, patella tibiaque 1^{a} paris subtus sat crebre nigro-crinitis et subfimbriatis, tibia aculeis inferioribus sat longis $4\cdot4$ et utrinque aculeis lateralibus binis multo minoribus, metatarso aculeis inferioribus $2\cdot2$ et aculeo lateralí parvo interiore apicali munitis, metatarso 2^{a} paris aculeis inferioribus aculeisque lateralibus parvis binis utrinque armato, pedes 3^{a} paris, praesertim femore patella tibiaque, pedibus 4^{a} paris multo longiores. Pedes-maxillares mediocre, albido-lutei, apice vix infuscati, supra (apice tarsi excepto) crebre et longe niveo-hirsuti; tibia patella breviore, apophysi nigra, brevi, valida et conica extus ad apicem armata; tarsus sat anguste ovato; bulbo longe ovato, ad basin oblique truncato, haud producto, ad apicem spina nigra parva munito.

Africa occid. : Sierra Leone.

Eustiromastix⁽¹⁾ major, sp. nov. — ♂ long. 9 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, prope oculos niger, rubro-pubescent, linea media abbreviata vittaque marginali latissima, postice interrupta, albido-luteo-pilos, decoratus. Pili oculorum fulvo-rufescentes. Clypeus crebre et longe albo-barbatus. Abdomen oblongum, depressiusculum, supra fuscum, fulvo albidoque sericeo-pubescent, vitta lata dilutio, in parte basali flexuosa, in parte altera valde pennata ornatum, subtus

(1) **Eustiromastix**, nom. nov. = *Cybele* Peckham, nomen praeoccup. Lovén. Crust., 1845.

fusco-testaceum, ad marginem dilutius. Chelae validae, longae et attenuatae, fusco-rufulae, valde transversim striatae et parce albido-crinitae. Partes oris sternumque olivacea. Pedes fulvi, tibiis metatarsisque, praesertim anticis, longe et confuse infuscatis. Pedes 1^{er} paris longissimi, tibia metatarsoque subtus setis tenuibus longis et curvatis munitis, supra maculis albo-pilosis ornatis, tibia subtus aculeis validis 2-3 et intus aculeis similibus binis armata, metatarso aculeis 2-2 armato. Pedes-maxillares lutei apice leviter infuscati; tibia patella multo breviore, angustiore, intus longe crinita, extus apophysi apicali parva et simplici munita; tarso longo, bulbum multo superante, hand curvato; bulbo disciformi, in medio membranaceo, stylo longo, circumflexum forante, bulbum apice multo superante et extus inflexo munito.

Brasilia : Rio Salobro prope Bahia (*E. Gounelle*).

E. Chaperi, sp. nov. — ♂ long. 8 mill. — Cephalothorax niger, supra crebre et longe fulvo rufuloque pubescens, antice, ad marginem frontalem et utrinque in declivitate, albo-pilosus. Pili oculorum albi, ad marginem exteriorem oculorum aurantiaci. Pili clypei densi et longi albi. Abdomen oblongum, postice attenuatum, supra fuscum et cervino-pubescent, vitta media dilutiore, valde sinuosa, in medio ampliata, albo rufuloque pilosa, ornatum, subtus testaceum et sericeo-pubescent. Mamillae mediae testaceae et albo-pilosa, reliquae nigrae, superiores intus longe albo-pilosae. Chelae robustae, fulvo-rufulae, opaceae et glabrae. Pedes fulvi, valde nigro-variati, femoribus anticis intus et subtus metatarsis anticis supra lineatis, reliquis articulis subannulatis. Pedes-maxillares fulvi, crebre et longe albo-hirsuti; tibia et brevi, apophysi exteriore brevi et obtusa munita; tarso longissimo et angusto, apice cylindraceo valde incurvo; bulbo mediocri, basin tarsi tantum occupante, sed valde convexo turbinato et membranaceo, intus stylo longissimo munito.

Colombia : Naricual (*M. Chaper*).

E. rufohirta, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-pubescent, postice sensim obscurior, antice utrinque maculis ocularibus nigris notatus, pilis miniaceis longis vestitus sed parte cephalica, praesertim antice, parteque thoracica ad marginem pallide flavo-pilosus. Pili oculorum pallide flavi, supra oculos medios pilis rufulis paucis intermixti. Pili clypei longi, flavescentes. Abdomen (valde detritum) angustum, fuscum, albido-pilosum, vittis duabus miniaceo-pilosis ornatum (?). Sternum fusco-rufescens. Chelae fusco-castaneae, transversim striolatae, ad basin longissime flavescenti-setosae. Pedes obscure fulvo-

rufescentes, late et valde nigricanti-annulati, femoribus anticis omnino infuscatis. Pedes-maxillares fusco-rufuli, tibia fere nigra: femore crasso; patella vix longiore quam latiore: tibia paulo breviore, extus valde dilatata et in apophysem fere globosam producta; tarso mediocri, attenuato; bulbo sat magno ad basin attenuato, intus stylo crasso marginato.

Le Para (*de Mathan*).

E. stylifera, sp. nov. — ♂ long. 7-9 mill. — Cephalothorax obscure fusco-rufescens, parte cephalica nigricanti, aurantiaco-pubescent, antice, pone oculos medios, macula magna alba ornata, parte thoracica macula anteriore longa vittaque marginali lata, postice interrupta, albido-flavescens notata. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei densi albi. Abdomen longum, pilis simplicibus nitido-flavidis subaureis, pilis albis intermixtis, vestitum, maculis parvis fuscis obliquis sex biserratim ordinatis, ornatum, subtus fusco-testaceum. Sternum fulvo-olivaceum, parce albo-pilosum. Partes oris fuscae. Chelae nigro-aenaeae, valde transversim striolatae. Pedes 1^o paris crassi fusi, patella paulo dilutiore, tibia ad basin albo-pilosa, metatarso tarsoque ab basin anguste testacea. Pedes 2^o paris infuscati. Pedes quatuor postici fulvi, plus minus fusco-annulati et punctati, tibiae metatarsique antici longe sed inordinate nigro-ciliati. Pedes-maxillares fulvi apice infuscati; patella paulo longiore quam latiore subparallela; tibia breviore et angustiore, apophysi apicali parva simplici et obtusa armata; tarso mediocri, longe ovato; bulbo disciformi, stylo longo omnino circumdato.

Regio Amazonica : Teste (*de Mathan*).

Capidava (1) **auriculata**, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica antice paulo dilutiore et rufescenti-tincta, ad marginem frontalem pilis albis munitus (fere omnino depilis). Pili oculorum albidi. Abdomen oblongum, atrum, pallide luteo-pubescent. Chelae fuscae, apice dilutiores et rufescentes, valde coriaceae et transversim rugatae. Partes oris sternumque fusco-castanea. Pedes nigricantes, coxis posticis paulo dilutioribus, metatarsis tarsisque fulvis. Pedes-maxillares breves et robusti, nigri; tibia apophysi exteriore magna, valde curvata fere semicirculari, intus excavata, apice angulosa et prominula, ad marginem dente incurvo munita, instructa; tarso bulboque late ovatis.

(1) **Capidava**, nov. gen. — Ab *Eustiromastici* et *Freya* differt oculis parvis ser. 2^o evidenter pone medium sitis, ab oculis posticis spatio oculo postico minore distantibus. — Typus : *C. auriculata* E. Simon.

Brasilia : Le Para (*de Mathan*).

C. biuncata, sp. nov. — ♂ long. 5 mill. — Cephalothorax paulo angustior, niger, ad marginem et utrinque albo-pilosus (fere omnino depilis). Pili oculorum longi albi. Clypeus in medio parce albo-pilosus. Abdomen oblongum, atrum, supra omnino flavo-nitido-pubescent. Chelae nigrae, valde coriaceo-opacae, ungue rufulo. Sternum, partes oris pedesque nigricantia, tarsis luteis. Pedes-maxillares breves et robusti, nigri; tibia patella breviore, latiore quam longiore, extus apophysi maxima, ad basin lata, sed apice longe attenuata, divaricata sed apice uncata et dente interiore minore munita, instructa; tarso bulboque late ovatis; bulbo valde convexo, stylo libero intus marginato.

Reg. Amazonica : Cameta (*de Mathan*).

C. rufithorax, sp. nov. — ♀ long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica nigra, thoracica vitta media dilutiore munita (fere omnino depilis). Pili oculorum flavidi. Clypeus sub oculis glaber, ad marginem pilis albis longis uniseriatis munitus. Abdomen sat longe oblongum, supra obscure testaceum, crebre nigro-punctatum, parce pilosum sed antice lineolis trinis abbreviatis albo-pilosus ornatum. Chelae robustae et laeves, partes oris, sternum, pedesque fulvo-rufescens. Pedes Ist paris reliquis paulo robustiores et obscuriores. Plaga genitalis fusco-nitida, plana, cordiformis.

Peruvia orient. : Yquitos (*de Mathan*).

Bathippus palabuanensis, sp. nov. — ♂ long. 9-10 mill. — Cephalothorax crassus et altus, parte cephalica nigricanti, subtiliter coriacea, in medio fere glabra, antice et utrinque, prope oculos, rubro-pilosa, parte thoracica fusco-castanea in medio et utrinque, sub oculis, paulo dilutiore. Pili oculorum laete coccinei. Clypeus angustus glaber. Abdomen angustum, supra atrum, fulvo-pubescent (fere depile). Chelae nigro-castaneae, opacae et subtiliter transversim striolatae, robustissimae, extus convexae, intus leviter deplanatae, valde divaricatae, cephalothorace haud breviores, haud carinatae, margine superiore sulci dente apicali angulari conico, denteque minore acuto remotissimo, margine inferiore dente apicali conico, denteque medio maximo, longo et acuto, apice leviter inflexo, subtus, paulo ante dente principali, dente minore conico et obliquo, armatis, ungue longissimo, bisinuoso, apice rufulo. Pedes Ist paris nigricantes vel fusco-castanei, coxa femoreque subtus ad basin dilutioribus. Reliqui pedes fulvi.

aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares obscure olivacei, utrinque nigro-vittati; femore gracili, valde curvato, fere semicirculari; patella plus triple longiore quam latiore; tibia patella longiore, graciliore, tereti et leviter curvata, extus ad apicem apophysi gracili recta et antice directa armata; tarso parvo ovato, intus longe piloso; bulbo cordiformi, apice stylo, circulum formante, munito.

Java : Palabuan (*Fruhstorfer*).

B. manicatus, sp. nov. — ♂ long. 8 mill. — Cephalothorax obscure fusco-castaneus, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra, antice, pone oculos medios, vitta longitudinali abbreviata, utrinque in declivitate, sub oculis, macula majore, parte thoracica linea media angusta et abbreviata, pallide flavidopilosus, ornatus. Pili oculorum flavidi. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum et longum, atrum, supra vitta duriuscula glabra et nitida violaceo-tincta ornatum, mammiae nigrae. Partes oris fusco-castaneae. Sternum coxaeque pedum lutea. Pedes quatuor antici nigricantes, tibiis ad basin luteo-annulatis, femore 2^o paris, apice excepto, luteo-lineato, femore 1^o paris apicem versus incrassato supra pilis nigris crassis, fimbriam formantibus, ornato, patella convexa subtus fimbria simili munita, reliquis artieulis gracilibus et subglabris. Pedes 3^o paris longissimi, nigricantes, femore ad basin minute luteo. Pedes 4^o paris fulvo-rufuli, femore in dimidio basali luteo. Chelae longissimae et porrectae, fusco-castaneae, et subtus et supra prope basin dilutiores, opaceae et subtiliter striatae, cylindraceae sed extus in parte apicali convexae, margine sulci superiore dentibus trinis, 1^o subapicali valido longo, apice acuto et paululum uncato, reliquiis binis minoribus et remotissimis, 4^o 2^o majore, margine inferiore dente singulo subapicali armato, ungue longissimo, leviter sinuoso, subtus, prope basin, dente parvo et obtuso munito. Pedes-maxillares longi et gracillimi, pallide lutei, femore ad basin infuscato, tarso leviter rufulo-tincto; patella plus quadruplo longiore quam latiore; tibia patella paulo longiore et paulo graciliore, extus ad apicem apophysi parva acuta et antice directa armata; tarso tibia circiter aequilongo, longe ovato; bulbo longo, simplici, apice stylo tenui, circulum formante, munito.

Borneo (ex mus. G. et E. Peckham).

B. Schalleri, sp. nov. — ♂ long. 8 mill. — Cephalothorax fulvofuscens, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra et rubro-pilosa. Pili oculorum flavo-aurantiaci. Clypeus sat angustus, imberbis. Abdomen angustum et longum, cylindraceum, atrum, utrinque et subtus

parce albido-pilosum, supra vitta lata duriuscula, nitida et glabra leviter violaceo-tineta, notatum. Partes oris, sternum pedesque fulvo-rufula, femore 3^o paris ad basin, femoribus 2^o et 4^o parium fere usque ad apicem, dilutionibus et luteis, femore patellaque 4^o paris fusco-castaneis, femore versus apicem sensim incrassato et longe claviformi supra fimbria longe nigro-pilosa ornata, patella convexa subtus fimbria simili munita, tibia graciliore fere glabra leviter curvata, apicem versus sensim infuscata, patellis tibiisque 2^o et 3^o parium leviter infuscatis. Chelae fulvo-rufulae, longae, porrectae et divaricatae, ut in praecedenti dentatae. Pedes-maxillares longissimi et gracillimi, pallide lutei ut in praecedenti sed apophysi tibiali paulo longiore et graciliore.

Pinang (*Raffray*).

Anarrhotus (¹) **fossulatus**, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax brevis, altissimus, niger, pilis pronis subsquamiformibus fulvo-aureis, pilis paucis viridi nitidis mixtis, crebre vestitus, parte cephalica postice, ante stria thoracica, lineola transversa recurva alba notata, thoracica, prope marginem fere glabra, parce albo-pilosa. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus parce et longe fulvo-pilosus. (Abdomen detritum.) Chelae debiles, parallelae, antice deplanatae, coriaceae, fusco-piceae, parce albido-pilosae, marginibus sulci valde obliquis, superiore dentibus angularibus binis geminatis, 4^o majore, inferiore dente medio-cri parum remoto, armatis. Partes oris fusco-piceae. Sternum paulo dilutius. Pedes fusco-picei, antici reliquis robustiores, nigricantes, tarsis posticis luteis, rufo-nitido albidoque pubescentes et variegati, antici subtus longius sed tenuiter pilosi haud fimbriati, aculeis ordinariis armati. Pedes-maxillares sat breves, fusco-picei, femore supra ad apicem patellaque nitido-pilosis; tibia patella multo breviore, apophysi apicali parva et acuta, extus armata; tarso longe ovato tibia cum patella saltem haud breviore; bulbo longo, ad basin producto attenuato et obtuso, ad apicem stylo brevi dentiformi munito.

Peninsula Malayana.

(1) **Anarrhotus**, nov. gen. — A *Pancorio* imprimis differt tibiis posticis aculeo dorsali subbasilari munitis, pedibus-maxillaribus maris brevibus, bulbo a 1 basin retro-producto, ad apicem stylo brevi munito. — Typus : *A. fossulatus* E. Simon.

